

## Recomendaciones para pacientes con alergia a Penicilinas y derivados beta-lactámicos

1. No se administrará ningún medicamento que en su composición lleve **Penicilina** ni derivados.

Listado de las principales penicilinas y derivados beta-lactámicos (y que por tanto no debe utilizar):

- **Penicilinas naturales:** Bencilpenicilina (Penicilina G), Fenoximetilpenicilina (Penicilina V), Feneticilina.
- **Penicilinas resistentes a Penicilinas:** Meticilina, Nafcilina, Oxacilina, Cloxacilina, Dicloxacilina.
- **Aminopenicilinas:** Ampicilina, Amoxicilina, Amoxicilina+ac. clavulánico, Bacampicilina, Metampicilina, Pivampicilina, y sus asociaciones con Clavulánico o Sulbactam.
- **Carboxi-ureido-penicilinas:** Carbenicilina, Ticarcilina, Azlocilina, Mezlocilina, Piperacilina (y su asociación con Tazobactam)
- **Amidinopenicilinas:** Mecilinam.
- **Monobactámicos:** Aztreonam.
- **Carbapenemes:** Imipenem, Meropenem.
- **Cefalosporinas 1ª generación:** Cefadroxilo, Cefalexina, Cefradina, Cefalotina, Cefapirina, Cefazolina.
- **Cefalosporinas 2ª generación:** Cefaclor, Cefprozilo, Cefminox, Cefoxitina, Cefamandol, Cefonicida, Cefuroxima.
- **Cefalosporinas 3ª generación:** Cefixima, Cefpodoxima, Ceftributeno, Cefotaxima, Ceftizoxima, Ceftriaxona, Cefoperazona, Ceftazidima.
- **Cefalosporinas 4ª generación:** Cefepima, Cefpiroma.

2. Puede utilizar otros antibióticos de grupos distintos a las Penicilinas y derivados beta-lactámicos.

3. Con preferencia utilizará la vía de administración oral.

4. Si es posible utilice medicamentos de un solo componente.

5. Tomará solo los medicamentos recomendados por su médico. **No se automedique.**