

## Pauta para extracción dentaria o cirugía menor en pacientes anticoagulados con sintrom y con moderado riesgo tromboembólico

Día	-2	-1	Cirugía	+1	+2	+3
Sintrom	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
HBPM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No

### 1. Dos días antes de la extracción o cirugía:

- Iniciar profilaxis antitrombótica con Heparina de Bajo Peso Molecular (**HBPM**) <sup>(1)</sup>: una inyección subcutánea.
- No tomará **SINTROM**.

### 2. Un día antes de la extracción o cirugía:

- **HBPM**: una inyección subcutánea.
- No tomará **SINTROM**.

### 3. El día de la extracción o cirugía:

- **HBPM**: una inyección subcutánea.
- **SINTROM**: por la noche, comenzará con la dosis habitual.
- Si sangrado post-extracción o post-cirugía efectuará enjuagues con **AMCHAFIBRIM ampollas** cada 2-4 horas mientras persista el sangrado.
- Antes de la extracción dentaria o cirugía, antibiótico si existe indicación de profilaxis de endocarditis infecciosa.

### 4. Día siguiente a la extracción o cirugía:

- **HBPM**: una inyección subcutánea.
- **SINTROM**: dosis habitual a la hora de siempre.

### 5. Dos días después de la extracción o cirugía:

- **HBPM**: una inyección subcutánea.
- **SINTROM**: dosis habitual a la hora de siempre.

### 6. Tres días después de la extracción o cirugía:

- Se suspende el tratamiento con **HBPM**.
- **SINTROM**: dosis habitual a la hora de siempre.

#### (1) Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM)

Cualquiera de las siguientes a la dosis indicada:

- **Fraxiparina 0,6 ml**, una subcutánea cada 24 horas.
- **Clexane 40 mg/0,4 ml**, una subcutánea cada 24 horas.
- **Fragmin 5.000 UI/0,2 ml**, una subcutánea cada 24 horas.

No en pacientes con alergia a HBPM o trombopenia inducida por heparina.

Unidad de Hemostasia y Trombosis. Servicio de Hematología. Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña (España)